

FOLLETO DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Medición del tiempo de tránsito colónico con marcadores radioopacos Transit-Pellets™

Lea la información de este folleto atentamente antes de comenzar a tomar los marcadores radioopacos Transit-Pellets™. Contiene información importante para usted. Utilice los marcadores radioopacos Transit-Pellets™ tal y como se indica en el folleto de información para el paciente o siguiendo las instrucciones de su médico. Conserve esta información. Podría necesitar volver a leerla.

- **MUY IMPORTANTE:** Asista puntualmente a su cita de rayos X
- **MUY IMPORTANTE:** Es muy importante que no use ningún tipo de laxantes hasta que su médico le indique que la prueba ha finalizado. Los laxantes incluyen estimulantes, fibras que añaden volumen, supositorios y enemas salinos
- Pregunte a su médico si necesita más información o consejo
- Informe a su médico si padece alguna alergia antes de comenzar la exploración
- Esta prueba no está indicada si está embarazada o cree que podría estarlo, ya que es necesaria una placa de rayos X de su abdomen
- Durante la semana de la exploración, no modifique su dieta habitual (comida o bebida)
- Hay muchos factores, como la dieta y la medicación, que pueden afectar al resultado. Informe a su médico de cualquier medicación que esté tomando antes de comenzar a tomar las cápsulas. Le indicará si es necesario interrumpir temporalmente la toma de otros medicamentos
- Si ha tomado más cápsulas de la cuenta o si ha tomado las cápsulas equivocadas, o si se ha olvidado una cápsula o no la ha tomado en el momento indicado, póngase en contacto con su médico para que le indique cómo proceder

En este folleto de información para el paciente encontrará información sobre:

- 1) ¿Qué es una prueba de tránsito colónico?
- 2) ¿Qué contiene la cápsula?
- 3) ¿Cómo es el proceso?
- 4) Cómo guardar los marcadores radioopacos Transit-Pellets™
- 5) Declaración de contenidos



1) ¿Qué es una prueba de tránsito colónico?

Su médico utiliza una prueba de tránsito colónico con marcadores radioopacos Transit-Pellets™ para diagnosticar a pacientes con estreñimiento crónico y para diferenciar entre estreñimiento lento y normal. La prueba muestra con qué velocidad pasa la comida por el sistema digestivo. La medición también se puede utilizar en casos de diarrea crónica para determinar si el trastorno está vinculado a un tránsito colónico excepcionalmente rápido o a uno normal. O su médico podría ofrecerle otro método. Si ese es el caso, pídale a su médico que le indique cuál es el método escogido para usted.

2) ¿Qué contiene la cápsula?

En la caja encontrará blísteres con marcadores radioopacos contenidos en siete (7) cápsulas. Puede ver los marcadores en las cápsulas antes de ingerirlas. La cápsula se disuelve y, al igual que pequeños trozos de alimento, los diminutos marcadores avanzarán por su tracto intestinal y por su colon. Expulsará los marcadores, que no son dañinos para usted, como parte de su deposición.

3) ¿Cómo es el proceso?

Los rayos X al séptimo día permitirán que su médico cuente los marcadores que aún siguen presentes en su tracto digestivo y que determine qué tipo de trastorno podría padecer y cómo tratarlo. Su médico comentará con usted el resultado de la prueba en una cita ambulatoria.

La tabla que se muestra a continuación le indica cuándo debe ingerir las cápsulas (a no ser que ya se le indique en la carta de citación) según la hora y la fecha de su cita de rayos X. Los tiempos especificados a continuación son solo un ejemplo.

Día	1	2	3	4	5	6:1	6:2	7
Hora	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00	21:00	09:00
Marcadores con forma de anillo	X	X	X	X	X			
Marcadores con forma de tubo						X	X	
Rayos X abdominales								Rayos X

Los blísteres están marcados con los números 1-6. Cada número representa un día en la tabla anterior. Ingera las cápsulas con agua según el número que se muestra en el dorso del blíster. Una (1) cápsula al día durante los primeros cinco días. En el sexto día deberá ingerir dos (2) cápsulas con un intervalo de 12 horas (consulte la tabla anterior).

Si le cuesta ingerir la cápsula, en lugar de agua intente ingerirla con algo como compota de manzana o yogur. La textura más espesa de un sólido suave puede facilitar la ingesta.

Asegúrese de respetar de forma precisa las horas indicadas, que incluyen la cita para su prueba de rayos X al séptimo día.

4) Cómo guardar los marcadores radioopacos Transit-Pellets™

Guárdelos a temperatura ambiente

Mantener fuera del alcance de los niños

5) Declaración de contenidos

Cápsula: Hypromellose methylcellulose E464

Marcadores: Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO₄ powder EMPROVE (22%)

Este documento tiene únicamente fines informativos y no debe sustituir a las indicaciones de que reciba de un profesional sanitario.



Código de lote



Fecha de caducidad



Fabricante



Consulte las instrucciones de uso

Fabricante: Medifactia AB

Dirección: Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN

Teléfono: +46 (0)8-460 072 06

Dirección web: <http://medifactia.com>

CE 0402